



Public Health
Prevent. Promote. Protect.

Henderson County, NC

Lo que debe saber sobre La tos ferina


¿Qué es la tos ferina?

La tos ferina es una enfermedad respiratoria muy contagiosa. Se propaga de persona a persona principalmente por medio de la tos y estornudo.

Se le llama tos ferina por el sonido que se emite al toser y después de tener un ataque de tos.

La tos ferina puede afectar a cualquiera, pero a infantes (niños pequeños) menores de 12 meses con el sistema inmune débil tienen más alto riesgo de tener complicaciones graves y hasta la muerte.

Los primeros síntomas pueden durar de 1 a 2 semanas y generalmente incluyen:




Fiebre baja
(menos de 100.4°F)



tos en ocasiones



**escurrimiento
nasal**




**pausas al respirar
(los bebés)**

Síntomas posteriores pueden incluir:



**Tos violenta, rápida y
ataques de tos sin control**



**emite un sonido al
inhalar**



vomito



**cansancio después de
ataques de tos**

Antibióticos

Se administran antibióticos preventivos a alguien quien ha sido expuesto a bacterias dañinas para ayudar a prevenir que se llegue a enfermar.

Si usted ha estado alrededor de alguien con tos ferina, hable con un proveedor médico para saber si se recomienda el uso de antibióticos preventivos. Aun después de tratamiento, algunas personas pueden continuar tosiendo y tener síntomas por semanas o meses.

Prevención

- Lavar las manos regularmente o use alcohol en gel.
- Cubra la nariz y boca cuando tose y estornude.
- Evite compartir utensilios, vasos, toallas, u otros artículos personales.
- Cuando sea posible evite el contacto cercano con personas enfermas.
- Si se desarrollan síntomas, manténgase Fuera del trabajo o la escuela y busque un consejo médico.

Vacunación

Las personas de todas las edades necesitan la

VACUNA CONTRA LA TOSFERINA



DTaP para niños pequeños	Tdap para preadolescentes	Tdap para mujeres embarazadas	Td o Tdap para adultos
✓ 2, 4 y 6 meses ✓ Entre los 15 y 18 meses ✓ Entre los 4 y 6 años	✓ Entre los 11 y 12 años	✓ Durante la semana 26 a 36 del embarazo	✓ En cualquier momento para quienes nunca la han recibido
www.cdc.gov/diphtheria			



Public Health
Prevent. Promote. Protect.

Henderson County, NC

Departamento de Salud Pública del Condado de Henderson



1200 Spartanburg Highway, Suite 100 Hendersonville, NC 28792



(828) 692-4223



www.hendersoncountync.gov/health

Updated: 11/2025